

Recours aux soins à l'accouchement et en période post-natale par les femmes en milieu précaire à Abidjan (Côte d'Ivoire)



*JG SACKOU-KOUAKOU, D BARRY, PL KOUAKOU, C BONI-AKPA, AAA DESQUITH, ML TIADÉ-TRA, T N'ZI-BOA, LPC KOUADIO
* juliekouakou77@gmail.com

Introduction

La mortalité maternelle et infantile, au cours de l'accouchement et en période post-natale reste encore élevée en Côte d'Ivoire. L'utilisation des services de santé au cours de ces périodes (Continuum de Soins Maternels (CSM)) contribue à réduire cette mortalité. Notre objectif était d'analyser le recours aux soins d'accouchement et de consultations post-natales (CPoN) dans deux quartiers précaires à Abidjan.

Méthode

Type d'étude

- Transversale descriptive exhaustive

Période

- 9-24/04/2022

Cadre: d'étude

- Ménages de 2 quartiers Précaires « Allakro » et « Belleville » à Cocody commune au nord d'Abidjan.

Population

- Mères ayant un enfant de moins de 2 ans.

Variables

- Caractéristiques socio-démographiques et connaissances sur l'accouchement et le post-natal
- Recours au CSM
- Recours aux services d'accouchement
- Réalisation des trois CPoN recommandées.

Analyse des données

- Univariée χ^2 à 5%

Résultats

1- Caractéristiques socio-démographiques

- N=146
- Âge moyen : de 28,16 ± (5,76) ans
- Non scolarisées : 56,8%

2- Connaissance d'au moins un signe de danger

- D'un accouchement compliqué : 16 %
- Durant le post-natal immédiat : 39 %

3- Accouchement et CPoN

- Par personnel qualifié : 97,3 %
- CPoN immédiate : 98,6 %
- 3 CPoN recommandées : 66 %

4- Facteurs associés au recours au CSM

- Mères qui ne connaissaient aucun signe de danger durant la période post-natale ($p < 0,001$)



Conclusion

- Méconnaissance des signes de dangers liés à l'accouchement et durant la période post-natale semble favoriser le besoin de respecter le continuum de soins accouchement-CPoN.
- Améliorer la littératie en santé des mères
- Utilisation des services de santé maternelle et infantile en connaissance de cause