

# CASCADE DE SOINS POUR LE VIH CHEZ LES PERSONNES NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉES À ABIDJAN EN CÔTE D'IVOIRE DE 2014 À 2018

A. E. Hounsa Epse Alla<sup>1</sup>, P. Akweongo<sup>2</sup>, A.S Pongathié<sup>3</sup>, A.R. Attia Epse Konan<sup>1</sup>, J. Sackou Epse Kouakou<sup>1</sup>, L. Kouadio<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, (Côte d'Ivoire), <sup>2</sup> University of Ghana, Accra (Ghana), <sup>3</sup> Direction de l'Informatique et de l'Information Sanitaire, Abidjan (Côte d'Ivoire)

## Introduction


- ≈ 80% des nouvelles infections VIH dues aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) non diagnostiquées/non traitées.
- Atteinte des cibles 90 90 90 fixés par l'ONUSIDA demeure cruciale face à la COVID-19 et au défi de l'exploitation plus active des données disponibles.
- Objectif: Evaluer les lacunes tout au long de la cascade de soins pour le VIH des PVVIH nouvellement diagnostiquées de 2014 à 2018 à Abidjan.

## Méthodes

- Etude descriptive transversale utilisant données du SIGDEP2 (Système d'Information de Gestion du Dossier Electronique du Patient version 2).
- Arrimage aux soins au cours des 3 mois suivant le diagnostic, initiation au traitement ARV dans l'année du diagnostic, maintien sous traitement ARV en 2018, suppression de la charge virale (<1000 copies/ml) et caractéristiques sociodémographiques collectés.
- Stata version 15 utilisé pour analyse statistique.

## Résultats (1)

### Nombre des PVVIH nouvellement diagnostiquées de 2014 à 2018, Abidjan




Nombre de PVVIH nouvellement diagnostiquées : 17 294 soit

- ✓ 76,5% ♀
- ✓ 83,3% > 15 ans
- ✓ 25 ans < 60,6% > 49 ans
- ✓ Niveau éducation primaire: 49,2%
- ✓ Niveau éducation supérieur: 20,9%

## Résultats (2)

### Cascade des soins VIH des PVVIH nouvellement diagnostiquées de 2014 à 2018, Abidjan



- Arrimage aux soins : 91,5%
- Initiation ARV: 74,8%
- Maintien sous ARV: 70,6%
- Suppression charge virale: 34,3%

## Conclusion

- Système de santé ivoirien performant dans l'arrimage aux soins VIH.
- Lacunes observées : maintien sous traitement ARV (<75%), initiation au traitement ARV et suppression de la charge virale qui étaient respectivement de 75% au lieu de 81% et 34% au lieu de 73% selon les cibles 90 90 90.
- Résultats de cette évaluation peuvent être utilisés pour résoudre les lacunes en matière de services.

Pour de plus amples informations

